



Autores:

Apaulaza Corrales, Kirenia ¹, Cabrera Prado, Anicia ², Sánchez Rojas, José Manuel ³, Miranda Concepción, Lorenzo Antonio ⁴, Valle Breña Helen ⁵

Presentador: Kirenia Apaulaza Corrales. Email del presentador: microguane@infomed.sld.cu

Título :Comportamiento de la Sífilis en un Área de Salud

PALABRAS CLAVES: VDRL, Diagnóstico, Treponema pallidum.

Introducción:



Actualmente las Infecciones de Transmisión Sexual siguen siendo un problema de salud a nivel mundial, destacándose dentro de este grupo la Sífilis quien resulta la de mayor trascendencia social.

Métodos:


Se realizó un estudio de investigación-desarrollo, observacional, descriptivo y transversal, con el objetivo de caracterizar la Sífilis desde el punto de vista clínico epidemiológico y microbiológico en los pacientes diagnosticados con dicha afección durante el período de Octubre de 2019 a Mayo de 2020 para elaborar un plan de acciones educativas, encaminadas a prevenir esta situación de salud. Se pesquisaron con VDRL a 2228 pacientes mayores de 15 años del área de salud Guane; la muestra correspondió con 50 de ellos que fueron reactivos al VDRL. Se obtuvo la información a través de historias clínicas y las encuestas elaboradas para este estudio mediante pesquisa activa, reflejándose en gráficos y tablas utilizándose el análisis estadístico mediante variables cualitativas y cuantitativas.

Resultados

Diagnóstico	Sexo				Total	
	Femenino		Masculino		No	%
	No	%	No	%		
Caso Confirmado	34	68,0	14	28,0	48	96,0
Caso no confirmado	2	4,0	0	0	2	4,0
Total	36	72,0	14	28,0	50	100,0



Titulación de anticuerpos	Forma clínica de presentación				Total	
	Primaria		Secundaria		No	%
	No	%	No	%		
1/2	0	0	0	0	0	0
1/4	0	0	0	0	0	0
1/8	31	64,6	0	0	31	64,6
1/16	17	35,4	0	0	17	35,4
Total	48	100	0	0	48	100,0



Conclusiones:

- La mayoría de los pacientes reactivos al VDRL fueron confirmados con el diagnóstico de Sífilis, prevaleciendo el sexo femenino.
- El no uso del condón y la promiscuidad favorecieron el desarrollo de la ITS.
- El área de salud Guane 2 incidió con el mayor numero de casos que no registraban vínculo laboral alguno.
- La totalidad de los pacientes estudiados desarrollaron la forma primaria de presentación de la enfermedad, con títulos de anticuerpos elevados.
- Solo una minoría de los casos estudiados tenía conocimiento de la Sífilis y Asesoramiento profesional.