


Autores: Dra. Ekaterines Zayas Tamayo, Dra. Karelía Columbié González, Lic. Ivett Mesa Castellanos, Lic. Adeline Pérez Infante, Lic. Cesar Poutou Sánchez.

Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología. Santiago de Cuba.

Introducción: La toxoplasmosis representa un importante riesgo para la salud y su forma de expresarse cobra importancia en los pacientes inmunodeprimidos.

Objetivo: Determinar la incidencia de Toxoplasmosis en pacientes con afecciones clínicas.

Materiales y Métodos: Se realizó un estudio observacional descriptivo, transversal, para determinar la incidencia toxoplasmosis en pacientes con afecciones clínicas. Desde enero 2020-diciembre 2021, en la provincia Santiago de Cuba. La población estuvo constituida por 264 sueros procedentes de todos los municipios de la provincia, procesados mediante la técnica Toxoplasma Látex.



RESULTADOS

Gráfico 1. Muestras procesadas según sexo.




Tabla 1. Pacientes según diagnóstico clínico

Diagnóstico Clínico	Nro de Pacientes	%
Retrovirosis Crónica	34	66.6
Uveítis	3	5.8
Corioretinitis	4	7.8
Ataxia	1	1.9
Síndrome Febril Prolongado	9	17.6
Total	51	100

Registro LPHEM

CONCLUSIONES

El estudio permitió conocer la incidencia de toxoplasmosis en pacientes con afecciones clínicas y su prevalencia en la retrovirosis crónica, que es la principal causa de inmunodepresión




Gráfico 2. Resultados reactivos según diluciones.

